

疾患名 胚細胞腫瘍(精巣腫瘍)プロトコール名 BEP 療法

- 進行・再発癌 術後補助化学療法 術前補助化学療法
 大量化学療法 局所療法 その他()

投与順	抗癌剤名(商品名・略号)	1日投与量	投与方法	投与期間	投与日(d1・d8等)
1	ETP	100mg/m ²	点滴	1時間	d1・2・3・4・5
2	CDDP	20mg/m ²	点滴	2時間	d1・2・3・4・5
3	BLM	30mg/body	皮下	緩徐	d2・ d9・d16
4					
5					
6					

1コース期間(次コースまでの標準期間)	3週間
総コース数	3～4コース
コース間での休薬の規定	骨髄抑制の遷延

減量規定・中止基準	特になし
投与量の増量規定	なし
投与期間の短縮規定	なし
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	規定は特にないが、ETP →CDDP →BLMの順で行なう
プレ Medikation・ポスト Medikation	CDDP: 投与前 1,000～2,000mlの補液 投与後 1,000～2,000mlの補液 必要に応じて利尿剤の投与

患者条件

禁忌: 重篤な肺機能障害、骨髄抑制、腎障害、心疾患を有する患者
胸部に放射線照射を受けている患者、ETP、CDDP および
BLMに過敏症を有する患者、妊婦など

除外規定

事実上の注意点

BLM の肺障害
 ETP の骨髄抑制
 CDDP の腎障害

] に更なる注意

その他(特記事項)

ブレオの総投与量は 360mg以下