

疾患名 卵巣癌プロトコール名 TJ (PTX + CBDCA) 療法

- 進行・再発癌 術後補助化学療法 術前補助化学療法
 大量化学療法 局所療法 その他()

投与順	抗癌剤名(商品名・略号)	1日投与量	投与方法	投与期間	投与日(d1・d8等)
1	パクリタキセル (タキソール・PTX)	180mg /m ²	div	3時間	d1
2	カルボプラチン (パラプラチン・CBDCA)	chatelutの式 AUC 5(5~6)	div	1時間	d1
3					

1コース期間(次コースまでの標準期間)	3 週間
総コース数	4~6コース 制限なし
コース間での休薬の規定	WBC < 3000 ・ 血小板 < 10万

減量規定・中止基準	パクリタキセルでショック既往→中止 腎機能低下時減量 WBC<3,000 血小板<10万 肝.腎.心に重篤な合併症がある時
投与量の増量規定	なし
投与期間の短縮規定	なし
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	①PTX ②CBDCA
プレメディケーション・ポストメディケーション	①デカドロン 20mg iv (div) ②レスタミンコーワ(10mg) 5錠 ③ガスター 20mg iv ④ゾフラン or カイトリル

患者条件

- ①パクリタキセルにアレルギーのない人 ④主たる臓器機能が保持されている
 ②WBC 4000/mm³ 以上 ⑤未治療例又は既治療終了後6ヶ月
 ③PS0~2 以上の再発例

除外規定

本剤に対する過敏症例

事実上の注意点

DM合併の患者 BSが上昇 ・ 血液毒性の副作用・・・重症(G-CSF併用)

その他(特記事項)

10~20コースまで延長が可能