

- 進行・再発癌     
  術後補助化学療法     
  術前補助化学療法  
 大量化学療法     
  局所療法     
  その他(      )

投与順	抗癌剤名(商品名・略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日(d1, d8等)
1	ドセタキセル(タキソテール・DOC)	25mg/m <sup>2</sup>	div	1時間	d1、8、15
2					

1コース期間 (次コースまでの標準期間)	4週間(3投1休)
総コース数	効果のある限り
コース間での休薬の規定	

減量規定・中止基準	Grade3以上の白血球数減少
投与量の増量規定	なし
投与期間の短縮規定	なし
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	なし
プレメディケーション・ポストメディケーション	プレメディケーション グラニセトロン3mg、デキサメタゾン8mg

※CTCAE v3.0

患者条件

- ・PS 0~2
- ・主要臓器の機能に大きな異常がない

除外規定

- 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- ・重篤な骨髄抑制のある患者
  - ・感染症を合併している患者
  - ・発熱を有し感染症の疑われる患者
  - ・本剤又はポリソルベート80含有製剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者
  - ・妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
  - ・ALP<正常上限2.5倍、transaminase<正常上限1.5倍、ビリルビン値<正常上限
  - ・タキサン系にアレルギーのある患者

実施上の注意点

- タキソテール
- ・浮腫の発現率及び重篤度が高く、これをおさえるため、コルチコステロイド経口剤による前投与が行われている。前投与としては、デキサメタゾン等のコルチコステロイドを、本剤の投与前日から3日間、単独経口投与することが望ましいとされている。