

- 進行・再発癌
 術後補助化学療法
 術前補助化学療法
 大量化学療法
 局所療法
 その他()

| 投与順 | 抗癌剤名(商品名・略号) | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日(d1, d8等) |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|
| 1 | Nab-Paclitaxel(アブラキサン・nab-PTX) | 100 mg/m ² | div | 30分 | d1, 8, 15 |
| 2 | Carboplatin(カルボプラチン・CBDCA) | AUC=6 | div | 1時間 | d1 |
| 3 | | | | | |

| | |
|---------------------|----------------|
| 1コース期間(次コースまでの標準期間) | 4週間 |
| 総コース数 | 1stのみ6コースまで |
| コース間での休薬の規定 | Grade3の血液毒性発現時 |

| | |
|------------------------|--|
| 減量規定・中止基準 | Grade4の好中球減少または血小板減少 |
| 投与量の増量規定 | なし |
| 投与期間の短縮規定 | なし |
| コースによる変化 | なし |
| 1日の中での抗癌剤投与順 | Nab-PTX → CBDCA |
| プレメディケーション・ポストメディケーション | プレメディケーション day1; デキサメタゾン注6.6 mg + 5-HT3拮抗剤 day8,15; デキサメタゾン注6.6 mg |

患者条件(初回条件)

※CTCAE v4.0

- ・PS 0~2
- ・主要臓器機能に大きな異常がない

除外規定

- ・PS 3以上
- ・重篤な骨髄抑制のある患者
- ・感染症を合併している患者
- ・本剤又はパクリタキセル、アルブミンに対し過敏症の既往歴のある患者、他の白金を含む薬剤に対し、重篤な過敏症の既往歴のある患者

実施上の注意点

慎重投与

- ・PS 2以上
- ・肝障害、腎障害のある患者
- ・糖尿病患者

- ・骨髄抑制のある患者
- ・75歳以上の高齢者
- ・間質性肺炎又は肺線維症の患者
- ・高血圧患者

その他(特記事項)

アブラキサン

- ・本剤投与時にはインラインフィルターは使用しない
- ・患者に血液製剤の同意書取得が必要。
- ・使用する毎に、血液製剤の伝票が必要。